

الفصل الثاني

التركيز والحسابات стикометрии

Concentrations and
Stoichiometric Calculations

1-2- مقدمة :

الأعداد стикومترية: تعبّر عن نسب المواد الكيميائية المتفاعلة، لذلك عند التعامل مع المعادلات الكيميائية لابد من معرفة النسب المتفاعلة بدقة والتي هي في غاية الأهمية عند إجراء الحسابات الضرورية والانتقال من واحدة تركيز إلى أخرى .

ويعرف التركيز: على أنه يمثل كمية العنصر أو المادة الموجودة في حجم أو وزن محدد من العينة المدرستة .
ويعبر عن التركيز بوحدات مختلفة تبعاً لنوع التحليل المدروس أو وفقاً لكمية العنصر الموجود في العينة المدرستة . ولندرس أهم الوحدات المستخدمة في الكيمياء التحليلية .

2-2- واحات التركيز :

يعبر عن التراكيز بواحات مختلفة منها النسبة المئوية الحجمية أو الوزنية ، المولارية ، النظمية ، الصيغية ، المولالية ، الكسر الجزيئي ، الجزء من الألف والأجزاء من المليون إلى آخره من واحات التركيز ولندرس أهم هذه الواحات .

2-2-1- التركيز كنسبة مئوية :

1 - التركيز كنسبة مئوية حجمية 7%: (وزن / حجم)

وهو يمثل وزن المادة المنحلة في 100 مل من محلول غالباً ما يرمز لها بـ % 7 فالمحلول الذي يحوي على 10 % كنسبة مئوية حجمية من كلوريد الصوديوم يعني أن كل 100 مل من محلول يحتوي على 10 غ من ملح كلوريد الصوديوم .

2 . التركيز كنسبة مئوية وزنية W % (وزن / وزن) :

هو يمثل وزن المادة المنشطة في 100 غ من المحلول . وغالباً ما يرمز لها بـ W %. لذلك العينة التي تحتوي على تركيز من ملح كربونات الصوديوم $W \% = \frac{\text{وزن كربونات الصوديوم}}{\text{وزن العينة}} \times 100$ % = 3 % . نسبة مئوية وزنية تعني أن كل 100 غ من العينة تحتوي على 3 غ من ملح كربونات الصوديوم .

و غالباً ما يتم الانتقال من النسبة المئوية الوزنية إلى النسبة المئوية الحجمية وبالعكس، لإجراء مثل هذا الانتقال لابد من إدخال مفهوم كثافة المحلول والذي يعبر عن وزن واحدة الحجم كما هو موضح في العلاقة التالية :

$$d = \frac{m}{V}$$

حيث تمثل كل من :

m = وزن المادة المنشلة مقدرة بالغرام

V = حجم محلول مقدراً بالمليلتر

d = كثافة محلول مقدراً بوحدة غ / مل

ولتوضيح كيفية الانتقال من النسبة الوزنية إلى النسبة الحجمية علينا ملاحظة المثالين التاليين :

مثال (1) :

محلول من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 10 % حجماً وكثافته 1.1 غ/مل والمطلوب حساب النسبة المئوية الوزنية له .

الحل :

كل 100 مل من محلول يحتوي على 10 غ من هيدروكسيد الصوديوم كل (100×1.1) غ من محلول يحتوي على 10 غ من هيدروكسيد الصوديوم كل 100 غ من محلول يحتوي على X غ من هيدروكسيد الصوديوم

$$X = W \% = 9.09\%$$

مثال (2) :

احسب النسبة المئوية الحجمية لمحلول من كلوريد الصوديوم تركيزه 20 % وزناً وكثافته

1.12 غ / مل

الحل :

كل 100 غ من المحلول يحتوي على 20 غ من ملح كلوريد الصوديوم

كل $\frac{100}{1.12}$ مل من المحلول يحتوي على 20 غ من ملح كلوريد
الصوديوم

كل 100 مل من المحلول يحتوي على X غ من ملح كلوريد

الصوديوم

$$X = V \% = 22.4 \%$$

3- التركيز كنسبة مئوية حجمية / حجمية : (حجم / حجم)

تستخدم هذه الوحدة عند التعامل مع مزيج من الغازات . وهي تمثل عدد الجوم الموجودة في 100 حجم من الغاز .

فمثلاً مزيج من الغازات يحتوي على 21 % أوكسجين كنسبة مئوية حجمية / حجمية , أي يحوي كل 100 حجم من هذا الغاز على 21 حجم من الأوكسجين . ولا تستخدم هذه الوحدة في المحاليل أثناء إجراء التحليل الكمي .

2-2-2- التركيز مقدراً بالمولارية (M) :

يعرف التركيز الجزيئي الحجمي باسم الجزيئية أو المولارية Molarity أو المولية وهو يمثل عدد الجزيئات الغرامية (عدد المولات) من المادة المنحلة في لیتر واحد من محلول . لذلك واحدة المولارية هي مول / لیتر (mol/L).

ويمكن تعريف المولارية بشكل آخر على أنها تمثل وزن المادة المنحلة في (1) لیتر من محلول مقسومة على الكتلة الجزيئية للمادة المنحلة وبالتالي:

$$M = \frac{\text{وزن المادة المنحله في (1) ليتر من المحلول}}{\frac{\text{عدد الجزيئات الغرامية من المادة المنحله}}{\text{عدد الليترات}}} = \frac{\text{الوزن الجزيئي للمادة المنحله}}{\text{وزن المادة المنحله}}$$

وتحسب عدد الجزيئات الغرامية من حاصل قسمة كتلة المادة المنحله (m) مقدرة بالغرام مقسومة على الكتلة الجزيئية (M_w) Molecular weight (مقدرة غ/مل ولو رمنا إلى وزن المادة المنحله في (1) ليتر من المحلول بالرمز (C) وبالتالي تصبح العلاقة السابقة كما يلي :

$$M_{(mol/L)} = \frac{m/M_w}{V} = \frac{C(g/L)}{M_w(g/mol)}$$

ومن هذا القانون يمكن حساب قيمة التركيز الجزيئي الحجمي (M) لمحلول ما إذا علم حجم هذا المحلول ووزن المادة المنحله .

فمثلاً : محلول من كربونات الصوديوم حجمه (1) ليتر ويحتوي على (10.6) غ من كربونات الصوديوم النقيه وبالتالي يكون تركيزه المولاري مساوياً :

$$M_{(mol/L)} = \frac{C_{(g/L)}}{Mw_{(g/mol)}} = \frac{10.6}{106} = 0.1$$

2-3-2- التركيز مقدراً بالنظامية (N) :

تعرف النظامية أو العيارية **Normality** بأنها تمثل عدد المكافئات الغرامية (أو عدد الأوزان المكافئة) من المادة المنحلة في ليتر من محلول لذلك واحدة النظامية هي مكافئ غرامي / ليتر (eq.g/L) كما يمكن تعريف النظامية بشكل آخر على أنها تمثل وزن المادة المنحلة في (1) ليتر من محلول مقسومة على الوزن المكافئ للمادة المنحلة .

وبالتالي يمكن التعبير عن تعريف النظامية بالعلاقة التالية:

$$N = \frac{\text{وزن المادة المنحلة في (1) ليتر من محلول}}{\text{الوزن المكافئ للمادة المنحلة}} = \frac{\text{عدد المكافئات الغرامية للمادة المنحلة}}{\text{عدد الليترات}}$$

حيث تحسب عدد المكافئات الغرامية للمادة المنحلة من حاصل قسمة كتلة المادة لمنحلة على وزنها المكافئ (equivalent weight) Ew

$$N_{(eq.-g/L)} = \frac{m/Ew}{V} = \frac{C_{(g/L)}}{Ew_{(g/eq.-g)}}$$

حيث C تمثل وزن المادة المنحلة في (1) ليتر من محلول مقدرة بالغرام .

لذلك من الملاحظ أنه دائماً عند التحدث عن النظامية يرافقها الوزن المكافئ دائماً ، ولهذا السبب يجب معرفة كيفية حساب الوزن المكافئ لمركب ما .

إن طريقة حساب الوزن المكافئ لمركب ما يتم عادة من حاصل قسمة الكتلة الجزيئية M_w على عدد المتبادلات (n) أو كمية المواد المتفاعلة (reacting units) في التفاعل الحاصل :

$$E_w_{(g/eq.g)} = \frac{M_w(g/mol)}{n(eq.g/mol)}$$

ولندرس كيفية حساب (n) لمادة ما:

1- إذا كانت المادة حمضية :

فإن قيمة n تمثل عدد البروتونات الموجودة في الصيغة الكيميائية فالوزن الجزيئي لحمض كلور الماء ذو الوزن الجزيئي 36.5 غ مول هو :

$$E_w_{(g/eq.g)} = \frac{36.5}{1} = 36.5 \text{ g/eq.g}$$

والوزن المكافئ لحمض الكبريت ذو الوزن الجزيئي 98 غ / مول هو يمثل وزنه الجزيئي مقسوماً على (2) لأنه يحتوي على وظيفتين حمضيتين :


$$Ew_{(g/eq.g)} = \frac{98}{2} = 49 \text{ g / eq.g}$$

وبالتالي الوزن المكافئ لمادة حمضية هي مثل الوزن الجزيئي مقسوماً على عدد البروتونات المتواجدة في هذا الحمض والتي تدخل في التفاعل فقط .

2- إذا كانت المادة قاعدية :

فالوزن المكافئ لها يحسب بالعلاقة حيث يمثل n عدد أيونات الهيدروكسيل وبالتالي الوزن المكافئ لهيدروكسيد الصوديوم يكون مساوياً إلى وزنه الجزيئي مقسوماً على واحد . بينما الوزن المكافئ لهيدروكسيد الكالسيوم يساوي إلى وزن الجزيئي مقسوماً على (2) .

3 - إذا كانت المادة تخضع لعملية الأكسدة والإرجاع :
 فإن الوزن المكافئ لمادة ما تخضع لعملية الأكسدة أو الإرجاع تمثل كتلتها الجزئية مقسومة على التغيير في رقم الأكسدة .
 فمثلاً برمونغات البوتاسيوم في الوسط الحمضي تتحول كما يلي :



لذلك فإن الوزن المكافئ لبرمونغات البوتاسيوم يساوي إلى وزنها الجزيئي مقسوماً على خمسة:

$$E_{W(g/eq.g)} = \frac{158.03}{5} = 31.61 \text{ g / eq.g}$$

4- الوزن المكافئ لملح ما :
 تحسب الأوزان المكافئة للأملاح المنحلة بالماء وذلك بتقسيم أوزانها الجزئية على عدد ذرات المعدن مضروباً بتكافئه :

الوزن الجزيئي للملح

$$E_w = \frac{\text{_____}}{\text{عدد ذرات المعدن} \times \text{تكافؤه}}$$

فالوزن الجزيئي لملح كربونات الصوديوم ذو الوزن الجزيئي 106 غ/مول
بحسب كما يلي :

$$E_w = \frac{106}{2 \times 1} = 53 \text{ g / eq.g}$$

وتقييد عدد المتبادلات n في المساهمة عند الانتقال من واحدة المولارية إلى النظمية أو بالعكس كما هو موضح فيما يلي :

وزن المادة المنحلة في (1) لิتر

$$N = \frac{\text{وزن المكافئ}}{\text{الوزن المكافئ}}$$

$$N = \frac{C_{(g/L)}}{Ew_{(g/eq.g)}} = \frac{C_{(g/L)}}{Mw/n}$$

$$N = n \frac{C}{Mw}$$

و بما أن الجزيئية (المولارية) تساوي :

$N = n \cdot M$ وبالتالي تصبح العلاقة :

أي بمعرفة عدد المتبادلات يمكن الانتقال ما بين النظمية والمولارية . كما تقييد النظمية في اشتقاق قانون المعايرة العام الذي هو يعتبر أساس أي معايرة حجمية ، ويمكن اشتقاقه كما يلي:

من المعروف أنه وفي أي تفاعل كيميائي يحصل بين مادتين يكون محققاً فيه دائماً :

$$\text{عددمكافئات المادة (1)} = \text{عددمكافئات المادة (2)}$$

ومن تعريف النظامية يمكن حساب عدد المكافئات

$$N = \frac{\text{عدد المكافئات}}{V}$$

عدد المكافئات = NV وتعويض هذه القيمة في المساواة السابقة نجد :

$$N_2 \cdot V_2 = N_1 \cdot V_1$$

وهو يعرف بقانون المعايرة العام، حيث يستخدم أثناء المعايرة الحجمية لذلك يسمى بقانون المعايرة الحجمية (أو قانون مور) . كما يستخدم أيضاً أثناء تمديد الحاليل.

٤-٢-٤- التركيز مقدراً بالصيغية (F) :

تعرف الصيغية (Formality F) على أنها تمثل عدد أوزان الصيغ الغرامية المنحلة التي استعملت أصلاً في تحضير ليتر واحد من محلول . إذ عند حساب المولية لمحلول ما يجب أن تتأين كامل المادة المذابة أو المنحلة في محلول . لكن في كثير من الأحيان لا يحصل ذلك حيث هناك مواد كثيرة تتأين فقط جزئياً ضمن محلول ولتجنب الاستعمال السيء للمولية تم استخدام واحدة التركيز الصيغية حيث تمثل الصيغية مجموع جميع الصيغ للمادة المنحلة في محلول . ولتوسيع مفهوم الصيغية بشكل أفضل نأخذ المثال التالي :

ليكن لدينا محلول من كلوريد الصوديوم تركيزه (1M) بما أن هذا الملح يتأين كامل لذلك من الممكن التعبير عن التركيز كما يلي :



$$\text{تركيز } [\text{Na}^+] = 1 \text{ مولاً} = 1 \text{ صيغياً} \quad \text{تركيز } [\text{Cl}^-] = 1 \text{ مولاً} = 1 \text{ صيغياً}$$

والتركيز بالنسبة إلى كلوريد الصوديوم يساوي الصفر كتركيز مولي لأنه يتأين بالماء تائيناً كاملاً . أما في محلول يحتوي على حمض الخل تركيزه (1M) . فيوجد ثلاثة أنواع مختلفة من الصيغ في محلول وهي H^+ ، CH_3COOH ، CH_3COO^- وبالتالي يُنتَج محلولاً تركيزه 1F (1 صيغياً) من حمض الخل لكن تركيزه الحقيقي بواحدة المولية هي أقل من 1M .

٢-٢-٥- التركيز مقدراً بالمولالية (L) :

تسمى المولالية (L) Molality أيضاً بالتركيز الجزيئي الوزني وهي تمثل عدد الجزيئات الغرامية الموجودة في كيلوغرام واحد من المذيب . أو وزن المادة المنحلة في واحد كيلوغرام من المادة المذيبة مقسومة على الوزن الجزيئي :

$$L = \frac{\text{عدد الجزيئات الغرامية}}{W} = \frac{C'}{M_w \text{ (g/mol)}}$$

حيث تمثل C' وزن المادة مقدرة بالغرام المنحلة في كيلوغرام واحد من المذيب W تمثل وزن المذيب مقدراً بالكيلوغرام .

لذلك واحدة المولالية هي مول / كغ (mol / Kg)

مثال :

احسب التركيز مقدراً بالمولالية (التركيز الجزيئي الوزني) ل محلول من كلوريد الصوديوم تركيزه 2 % وزناً

الحل :

إن تركيز محلول كلوريد الصوديوم 2 % وزناً يعني أن :
كل 100 غ من المحلول يحتوي على 2 غ من ملح كلوريد الصوديوم
أي كل 98 غ من المحلول يذوب فيها 2 غ من ملح كلوريد الصوديوم
بالتالي 1000 غ من المحلول يذوب فيها C غ من ملح كلوريد الصوديوم

$$C = \frac{1000 \times 2}{98} = 20.41 \text{ g}$$

وبالتالي إن التركيز الجزيئي الوزني (المولالية) تحسب كما يلي :

$$L = \frac{C}{M_w} = \frac{20.41}{58.5} = 0.349 \text{ mol / Kg}$$

حيث الوزن الجزيئي لملح كلوريد الصوديوم هو 58.5 غ/مول

مثال :

محلول من كلوريد الصوديوم تركيزه الجزيئي الوزني (2L) وكتافته 1.08 غ/مل والمطلوب حساب المolarية لهذا محلول :

الحل :

$$L = \frac{C'}{M_w} \Rightarrow C' = L \cdot M_w$$

$$C' = 2 \times 58.5 = 117 \text{ g}$$

(m) إن وزن محلول هو مجموع وزني المذيب والمذاب معاً وبالتالي وزن محلول يساوي:

$$m = 1000 + 117 = 1117 \text{ g}$$

وبالتالي يمكن حساب حجم هذا محلول بتطبيق قانون الكثافة :

$$d = \frac{m}{V}$$

$$V = \frac{m}{d} = \frac{1117}{1.08} = 1034.4 \text{ ml}$$

وبالتالي التركيز الوزني :

إن كل 1034.4 مل يمثل محلول يحوي 117 غ من ملح كلوريد الصوديوم

بالتالي كل 1000 مل يمثل محلول C غ من ملح كلوريد الصوديوم

$$C = \frac{1000 \times 117}{1034.4} \Rightarrow C = 113.12 \text{ g/L}$$

وبالتالي يكون التركيز الجزيئي الحجمي (المولارية) للمحلول :

$$M = \frac{C}{M_w} = \frac{113.12}{58.8} = 1.93 \text{ mol/L}$$

مثال :

احسب التركيز الجزيئي الوزني لمحلول من حمض كلور الماء تركيزه $2M$ وكتافته 1.1 g/mL .

الحل :

بتطبيق قانون الكثافة يمكن حساب وزن ليتر من المحول الحمضي :

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow m = d \cdot V = 1.1 \times 1000 = 1100 \text{ g}$$

ويمكن حساب وزن حمض كلور الماء الموجود في ليتر من محلول كما يلي :

$$M = \frac{C}{M_w} \Rightarrow C = M \cdot M_w = 2 \times 36.5 = 73 \text{ g/L}$$

وبالتالي فإن وزن المحل (المذيب) يساوي :

$$1100 - 73 = 1027 \text{ g}$$

أي يمكن كتابة :

كل 1027 g من المذيب مضاد لها 73 g من حمض كلور الماء
كل 1000 g من المذيب مضاد لها C' من حمض كلور الماء

$$C' = \frac{1000 \times 73}{1027} = 36.03 \text{ g}$$

$$L = \frac{C'}{M_w} = \frac{36.03}{36.5} = 0.987 \text{ mol/Kg}$$

2-2-6- الكسر الجزيئي (الكسر المولى):

ويعرف أحياناً تحت اسم الكسر المولى، وهو يمثل عدد الجزيئات الغرامية لمكون ما مقسوماً على العدد الكلي للجزيئات الغرامية للمكونات جميعها . فلو كان لدينا محلول يحتوي على مكون واحد فإن الكسر الجزيئي للمادة المنحلة يعطى بالعلاقة التالية:

$$X_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$$

حيث يمثل كل من

x_1 : الكسر الجزيئي للمادة المنحلة

n_1 : عدد الجزيئات الغرامية للمادة المنحلة .

n_2 : عدد الجزيئات الغرامية للمحل .

كما يعطى الكسر الجزيئي للمحل بالعلاقة التالية :

$$X_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

حيث يمثل x_2 الكسر الجزيئي للمحل .

وشكل عام يعطى الكسر الجزيئي بالعلاقة العامة التالية :

$$X_i = \frac{n_i}{\sum_{i=1}^n n_i}$$

حيث تمثل x_i : الكسر الجزيئي للمكون i
 n_i : عدد الجزيئات الغرامية للمكون i .

ومن المفيد معرفته بأن مجموع الكسور الجزيئية لمكونات محلول يجب أن يساوي الواحد دائماً أي يمكن تمثيل ذلك رياضياً بالعلاقة التالية :

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1$$

مثال :

احسب الكسور الجزيئية لكافة مكونات محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 15% كنسبة مئوية وزنية .

الحل :

من تعريف النسبة المئوية الوزنية والتي تمثل وزن المادة المنحلة في 100 غ من محلول . يمكن حساب وزن هيدروكسيد الصوديوم ووزن الماء .

حيث أن كل 100 غ من محلول يحتوي على 15 غ من هيدروكسيد الصوديوم و 85 غ من الماء .

وبالتالي يمكن حساب عدد الجزيئات الغرامية لكل من هيدروكسيد الصوديوم والماء

.

$$n = \frac{\text{وزن المادة}}{\text{وزنها الجزيئي}} = \frac{m (\text{g})}{Mw (\text{g/mol})}$$

$$n_{NaOH} = \frac{15}{40} = 0.375 \text{ mol}$$

$$n_{H_2O} = \frac{85}{18} = 4.722 \text{ mol}$$

أما الكسور الجزيئية لمكونات محلول تحسب كما يلي :

$$X_{NaOH} = \frac{n_{NaOH}}{n_{NaOH} + n_{H_2O}}$$

$$X_{NaOH} = \frac{0.375}{0.375 + 4.722} = 0.074 \quad , \quad X_{H_2O} = \frac{4.722}{0.375 + 4.722} = 0.926$$

ومن الملاحظ أن مجموع الكسور الجزيئية يجب أن تساوي الواحد في أي محلول ما.

$$X_{NaOH} + X_{H_2O} = 0.074 + 0.926 = 1$$

2-2-7- التركيز بأجزاء من الألف وأجزاء من المليون :

- التركيز بأجزاء من الألف : ppt

هو التركيز في الميلي غرام لكل غرام أي يعبر عن وجود جزء وزني واحد في كل ألف جزء وزني من المادة (مغ / غ).

- التركيز بالأجزاء من المليون : ppm

هو التركيز في الميلي غرام لكل كيلو غرام أي (مغ/كغ) أي يعبر عن وجود جزء وزني واحد في كل مليون جزء وزني من المادة .

فعندما يقال عن تركيز الذهب في سبيكة ما ppt 5 يعني أن السبيكة تحتوي على خمسة أجزاء من الذهب في كل ألف جزء وزني في السبيكة .

وعندما يقال إن تركيز أيونات الكالسيوم في مياه الشرب هو ppm 120 يعني أن تركيز أيونات الكالسيوم 120 ملغم في واحد كيلو غرام من الماء . وبما أن كثافة الماء النقي تساوي الواحد . وبالتالي يقال إن تركيز أيون الكالسيوم في مياه الشرب هو 120 ملغم / لتر . أي بتقريب أولي تصبح واحدة الـ ppm تمثل وزن المادة المنحلة مقدرة بالميلي غرام في لتر واحد من محلول أي واحتتها مغ/لتر .

وتستخدم وحدتا القياس المنخفضة في المحاليل .

مثال :

محلول مائي يحتوي على كلوريد الصوديوم بتركيز قدره $M = 0.001$ والمطلوب حساب تركيز هذا الملح بواحدة الجزء بالمليون . ppm

الحل :

من تعريف المولية التي تعطى بالعلاقة
بال التالي يمكن حساب التركيز مقدراً بالغرام / لتر

$$C = M \cdot M_w = 0.001 \times 58.5 = 0.00585 \text{ g / L}$$

أي أن التركيز مقدراً بال ppm هو :

$$ppm = 0.00585 \times 1000 = 5.85 \text{ mg / L}$$

2-2-8- التركيز بطريقة التصالب :


هناك طريقة تطبق لتحضير محلول ما، وذلك عندما يوجد محلolan بتركيز مختلفة ويراد تحضير محلول جديد تركيزه يقع بينهما . تطبق في هذه الحالة طريقة التصالب في حساب الجروم الواجب أخذها من المحلولين لتحضير محلول الجديد ولنأخذ المثال التالي الذي يوضح مبدأ هذه الطريقة .

مثال :

حضر محلولاً من ملح كلوريد الصوديوم تركيز $4N$ من مزج محلولين لماء كلوريد الصوديوم تركيز الأول $6N$ والثاني تركيزه $1N$ الحل :

لحل هذه المسألة نتبع طريقة التصالب وذلك كما يلي :

نضع تراكيز المحاليل الموجودة على الجهة اليسرى فوق بعضها بعضاً ، وهما $6N$ و $1N$ ونضع بينهما وعلى اليمين محلول المراد تحضيره $4N$ ويتم الوصل بشكل تصاليبي بين هذه المقادير كما يلي:




ثم نقوم بعملية الطرح بشكل تصاليبي (التركيز الكبير مطروحاً من التركيز الصغير) لكي تكون القيمة موجبة دائماً ، أي أن :

$$6 - 4 = 2$$

$$4 - 1 = 3$$

ويتم وضع نتائج الطرح باتجاه الأسهم أي بالشكل التالي :



أي أن الحجم المأخوذ من المحلول ذي التركيز $6N$ هو 3 أجزاء بينما الحجم المأخوذ من المحلول ذي التركيز $1N$ هو جزئين . تمزج هذه الأجزاء مع بعضها فيتم تحضير محلول من ملح كلوريد الصوديوم تركيزه $4N$ أي نسبة المحلول الأول ($6N$) إلى المحلول الثاني ($1N$) في المزيج هي نسبة 3 إلى 2 على الترتيب .

لذلك عند تحضير محلول من ملح كلوريد الصوديوم تركيزه 4N وحجمه 1000 مل يتم من خلال طريقة التصالب السابقة حساب الأجزاء ومن ثم يتم حساب الحجوم، حيث يحسب مقدار الجزء الواحد الواجب أخذه بتقسيم الحجم الكلي المراد تحضيره على عدد الأجزاء الكلية كما يلي :

$$1000/5=200 \text{ ml}$$

بالتالي الحجم الواجب أخذه من المحلول الأول ذي التركيز 6N هو يمثل حجم الجزء الواحد مضروباً بعدد الأجزاء الواجب أخذها منه وبالتالي هو مساوٍ :

$$200 \times 3 = 600 \text{ ml}$$

أما الحجم الواجب أخذه من المحلول الثاني ذي التركيز 1N هو :


$$200 \times 2 = 400 \text{ ml}$$

مثال :

محلول من حمض الأزوت تركيزه 6N والمطلوب تحضير محلول منه تركيزه 2N وحجمه 600 مل

الحل :

يمكن تطبيق قاعدة التصالب في تحضير محلول هذا الحمض على اعتبار أن تركيز الحمض في الماء المقطر مساوياً للصفر



بالتالي لتحضير حجم معين من حمض الأزوت ذي التركيز $2N$ نأخذ 2 جزء (2 حجم) من الحمض ذي التركيز $6N$ ويمزج مع أربعة أجزاء (4 حجوم) من الماء فيتتم تحضير محلول المطلوب .

أي أن مجموع الأجزاء هي ستة أجزاء وبالتالي مقدار الجزء الواحد هو :

$$600/6 = 100 \text{ ml}$$

والحجم المطلوب أخذه من محلول الحمضي الأول هو :

$$100 \times 2 = 200 \text{ ml}$$


أما حجم الحمض الواجب أخذه من الماء المقطر هو :

$$100 \times 4 = 400 \text{ ml}$$

أي لتحضير محلول تركيزه $2N$ وحجمه 600 مل يتم أخذ 200 مل من محلول الحمض ذي التركيز $6N$ ويوضع فوقه 400 مل من الماء المقطر ويمزج بشكل جيد فيكون قد تم تحضير محلول المطلوب .

مثال :

حضر محلولاً من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 50 % حجماً من مزج محلولين تركيز أحدهما 60 % والأخر 20 %
الحل : بتطبيق قاعدة التصالب نجد :




لذلك يتم مزج 30 مل من المحلول الأول (تركيزه 60 %) مع 10 مل من المحلول الثاني (تركيزه 20 %) يكون قد تم تحضير المحلول المطلوب

مثال :

احسب الوزنين الواجب أخذهما من محلولين لحمض كلور الماء الأول تركيزه 35% وزناً والثاني تركيزه 15% وزناً لتحضير محلول من حمض كلور الماء تركيزه 20% وزناً وزنه 1 كغ .

الحل :

يتم الحل باستخدام طريقة التصالب :



أي يتم أخذ من محلول الأول ذي التركيز 35% وزنه قدرها 5 غ وتمزج مع 15 غ من محلول الثاني ذي التركيز 15% فيكون قد تم تحضير محلول وزنه 20 غ.

ولتحضير محلول وزنه 1 كغ نتبع ما يلي :

إن مجموع الأجزاء الواجب أخذها هي عشرون جزءاً : $5+15=20$

بالتالي نسبة الجزء الواحد هي :

$$1000/20=50 \text{ g}$$

بالتالي الوزن المأخذ من محلول الأول ذي التركيز 35 % هو :

$$50 \times 5 = 250 \text{ g}$$

والكمية المأخذة من محلول الثاني ذي التركيز 15 % هي :

$$50 \times 15 = 750 \text{ g}$$

لهذا عند تحضير محلول وزنه 1Kg من محلول المطلوب يمزج 250 غ من محلول الأول ذي التركيز 35 % مع 750 غ من محلول الثاني ذي التركيز 15 % فيكون قد تم المطلوب .

The End